


FRENULOPLASTIKA – INFORMATIVNI LETAK

Produžavanje frenuluma je kirurški postupak kojim se produžuje skraćeni frenulum.

Pod lokalnom, regionalnom ili općom anestezijom frenulum se presječe poprečno. Zašije se apsorbivnim koncem. Krvarenje se zaustavi.



Opći rizici:

Mogući su rizici vezani uz anesteziju.

Moguće su nuspojave vezane uz korištene lijekova. Obično lagana vrtoglavica, mučnina, kožni osip ili konstipacija.

Specifični rizici:

- Krvarenje iz rane može se nastaviti i nakon operacije zbog čega je rijetko potrebna nova operacija.
- Moguć je podljev ili oticanje penisa koji nakon nekoliko dana spontano nestane.
- Moguća je infekcija rane zbog čeg je ponekad potrebno uzimati antibiotike.
- Ukoliko se odstrani previše kože mogući su problemi s erekcijom.
- Moguće da vam se ne sviđa kozmetski efekt.
- Iznimno rijetko, vanjski otvor mokraćne cijevi može biti nenamjerno ozlijeđen tijekom operacije.
- Moguća je promjena u osjetu tijekom seksualnog odnosa.
- Svaka erekcija u postoperativnom razdoblju je bolna i ne preporučuje se te može uzrokovati pucanje šava. Ukoliko se to dogodi šavi će se morati ponovno postaviti.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.