


**HIDROCELA – INFORMATIVNI LETAK**

**Hidrocela je nakupina tekućine oko testisa.**

**Zahvat se provodi pod općom ili lokalnom anestezijom. Mali operativni rez se učini u području mošnjji. Testis sa tekućinom (hidrocelom) se oslobodi od ovojnice te se tada vadi kroz ranu. Otvara se prednja strana hidrocelne vreće te se ispusti zaostala tekućina. Pregleda se testis. Višak tkiva vreće (ako ga ima) se odstrani, a ostatak se zašije tako da se izokrene sa unutrašnje strane testisa da bi se spriječilo ponovno nakupljanje tekućine. Testis se vraća unutar mošnje.**

**Svako krvarenje se zaustavlja i rana se zatvara.**



**RIZICI:** ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

Operacija **hidrocele** uključuje slijedeće specifične rizike i ograničenja:

- Ponekad je moguće da operacije bude popraćena bolovima, oteklinom, a povremeno i iscjetkom. Češće se to događa kada je hidrocela vrlo velika. Stanje obično postaje bolje za nekoliko dana ili tjedana, ovisno o veličini hidrocele.
- Rana se može inficirati, što je popraćeno crvenilom. U tom slučaju bi mogli biti potrebni antibiotici.
- Moguće je da bude svrbeža ili nelagode u predjelu rane koje može potrajati i do 6 mjeseci.
- Moguće je krvarenje unutar mošnjji nakon operacije, koje može stvoriti hematom ili krvni ugrušak. Tijekom slijedećih tjedana će se hematom povlačiti ili će, u slučaju da je hematom velik, biti potrebna daljnja operacija.
- Moguća je pojava neosjetljivosti u području operativnog ožiljka tijekom nekog vremena; stanje bi se trebalo poboljšati za par mjeseci.
- Moguća je pojava određene nelagode ili zadebljanja oko operiranog testisa koje može ostati nakon operacije.
- Moguća je ponovna pojava hidrocele
- Moguća je atrofija (smanjenje) testisa

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.