


OBOSTRANA ORHIDEKTOMIJA – INFORMATIVNI LETAK

Obostrana orhidektomija znači odstranjenje tkiva oba testisa (najvećeg proizvođača muškog spolnog hormona-testosterona) radi liječenja raka prostate koji je hormonski ovisan.

Zahvat se provodi pod općom ili lokalnom onestezijom. Operativni rez se učini u području mošnji. Svaki testis se oslobodi od ovojnice te se tada vadi kroz ranu. Otvara se kapsula testisa te se izvadi tkivo koje proizvodi hormone. Zašije se kapsula testisa te se svaki od testisa vrati u svoje ležište. Svako krvarenje se zaustavlja i rana se zatvara.



RIZICI:

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

BILATERALNA ORHIDEKTOMIJA ima određene rizike i ograničenja:

- Rana se može inficirati, što je popraćeno crvenilom, bolovima, oteklinom, a povremeno i iscjerkom. U tom slučaju bi mogli biti potrebni antibiotici.
- Nakon ove operacije stanje je nepovratno.
- Moguće je krvarenje unutar skrotuma nakon operacije, koje može stvoriti skrotalni hematoma ili krvni ugrušak. Tijekom slijedećih tjedana će se hematoma povlačiti ili će, u slučaju da je hematoma velik, biti potrebna daljnja operacija.
- Moguća je pojava neosjetljivosti u području operativnog ožiljka tijekom nekog vremena; stanje bi se trebalo eventualno poboljšati.
- Moguće da će biti određenih poteškoća prilikom mokrenja a možda će mi biti potrebno staviti privremeno urinarni kateter.
- Princip operacije je smanjenje testosterona u krvi, što uzrokuje smanjenje želje za seksualnim aktivnostima. Biti ćete impotentni nakon operacije.
- Moguće je zatezanje u prsima i oticanje bradavica jedno vrijeme.
- Moguće je da dobijete napade vrućine (“valunge”).
- Nećete biti sposobni začeti vlastitu djecu u budućnosti.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.