


**ORHIDOPEKSIJA – INFORMATIVNI LETAK**

**Orhidopeksija označava operaciju nespuštenog (retiniranog) testisa, kojom se isti spušta i fiksira u skrotum (mošnjje).**

**Zahvat se provodi pod općom anestezijom. Operativni rez se nalazi u preponskoj regiji, na strani nespuštenog testisa. Nakon pronalaska testisa i spermatičkog tračka te njihovog oslobađanja od okolnih struktura, učini se rez u području mošnjji te se testis fiksira uz stjenku. Svako krvarenje se zaustavlja i rane se zatvaraju, prvo u preponskoj regiji, a zatim na mošnjama.**

**Normalna anatomija**      **Nespušteni testis**



**RIZICI:**

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

**ORHIDOPEKSIJA** ima određene rizike i ograničenja:

- Rana se može inficirati, što je popraćeno crvenilom, bolovima, oteklinom, a povremeno i iscjetkom. U tom slučaju bi mogli biti potrebni antibiotici.
- Moguć je pronalazak testisa koji je slabije razvijen (hipotrofičan, atrofičan) te, u starijoj dobi, testisa sa tumorskim procesom. U posljednjem slučaju, zahvaćeni testis će biti potrebno odstraniti u istom aktu te poslati na patohistološku analizu.
- Postoji mogućnost da se nespušteni testis ne pronade.
- Nakon ove operacije moguće je povlačenje testisa natrag u preponsku regiju; u tom slučaju će biti potrebna dodatna operacija.
- Moguće je krvarenje unutar skrotuma nakon operacije, koje može stvoriti skrotalni hematoma ili krvni ugrušak. Tijekom slijedećih tjedana će se hematoma povlačiti ili će, u slučaju da je hematoma velik, biti potrebna daljnja operacija.
- Moguća je pojava neosjetljivosti u području operativnog ožiljka tijekom nekog vremena; stanje bi se trebalo eventualno poboljšati.
- Postoperativno je moguće javljanje torzije (zakretanja testisa oko vlastite osi) i potrebe za novim op. zahvatom.