

PIJELOLITOTOMIJA – INFORMATIVNI LETAK

Pijelolitotomija je otvorena operacija kojom se odstranjuju kamenci kroz inciziju na pijelonu. Ponekad je potrebno učiniti i inciziju kroz bubrežni parenhim. Operacija se izvodi u općoj anesteziji, obično rezom u slabinskoj regiji (lumbotomija), no mogući su i drugi kirurški pristupi. Tijekom operacije ponekad je potrebno u mokraćovod postaviti JJ stent, koji se odstranjuje nakon 4-6 tjedana endoskopskim putem (instrumentom uvedenim kroz mokraćnu cijev do mjehura). Operativno područje drenira se PVC drenom, koji se odstranjuje nakon 2-3 dana. Nakon operacije pacijent ima i urinarni kateter, koji se vadi nakon nekoliko dana. Šavi kože vade se obično nakon 8 dana.



Opći rizici:

Mogući su rizici vezani uz anesteziju.

Moguće su nuspojave vezane uz korištene lijekova. Obično lagana vrtoglavica, mučnina, kožni osip ili konstipacija.

Specifični rizici:

- Tijekom operacije moguća je pojava krvarenja, zbog čega će možda biti potrebne transfuzije krvi.
- Može doći do infekcije mokraćnih puteva ili samog operativnog reza, zbog čega će možda biti potrebna antibiotska terapija.
- Nakon operacije može doći do pojave kile u području reza.
- Tijekom operacije može doći do nenamjerne ozljede okolnih organa i tkiva, koje će se zbrinuti tijekom operacije ili će možda biti potrebne naknadne operacije.
- Može doći do curenja urina na dren, odnosno operativni rez, što može proći spontano ili će biti potrebna nova operacija.
- Rezidualni konkrementi(nisu mogli biti odstranjeni operativno).
- Smanjenje bubrežne funkcije nakon operacije

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.