


**OB BJELOVAR**  
**JEDINICA SAMOSTALNE DJELATNOSTI UROLOGIJE**

**RADIKALNA ORHIDEKTOMIJA – INFORMATIVNI LETAK**

Radikalna orhidektomija znači odstranjenje zahvaćenog testisa i donjeg dijela spermatičkog tračka kroz preponu.

Zahvat se provodi pod općom ili spinalnom anestezijom. Mali operativni rez se učini u području prepone i tračak se oslobodi od okolnih struktura. Spermatički tračak i njegova krvna opskrba se podvežu i odrežu, testis se tada vadi kroz ranu i šalje na patohistološku analizu. Svako krvarenje se zaustavlja i rana se zatvara.



**RIZICI:**

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

**RADIKALNA ORHIDEKTOMIJA** ima određene rizike i ograničenja:

- Rana se može inficirati, što je popraćeno crvenilom, bolovima, oteklinom, a povremeno i iscjetkom. U tom slučaju bi mogli biti potrebni antibiotici.
- Moguće je krvarenje unutar mošnjaci nakon operacije, koje može stvoriti hematoma ili krvni ugrušak. Tijekom slijedećih tjedana će se hematoma povlačiti ili će, u slučaju da je hematoma velik, biti potrebna dodatna operacija.
- Moguća je pojava neosjetljivosti u području operativnog ožiljka tijekom nekog vremena. Stanje bi se trebalo eventualno poboljšati.
- Ovisno o tipu tumora, moguće je da će trebati daljnje liječenje, što može uključiti kemoterapiju, zračenje ili dodatni operativni zahvat.
- Nekoliko godina nakon operacije će trebati pomno praćenje stanja, pretrage krvi i rendgenske snimke.
- Postoji vjerojatnost da ćete umrijeti od komplikacija operativnog zahvata.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.