


SPERMATOCELA – INFORMATIVNI LETAK

Spermatocele je cista u području epididimisa koja sadržava spermije. Točan uzrok nastanka nije poznat.

Zahvat se provodi pod općom ili lokalnom anestezijom. Mali operativni rez se učini u području mošnji. Testis se oslobodi od ovojnice te se tada vadi kroz ranu. Spermatocele se odvoji od epididimisa i testis se vraća unutar mošnje. Svako krvarenje se zaustavlja i rana se zatvara.



RIZICI: ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

Operacija **spermatocele** uključuje slijedeće specifične rizike i ograničenja:

- Ponekad je moguće da operacije bude popraćena bolovima, oteklinom, a povremeno i iscjetkom. Češće se to događa kada je spermatocele vrlo velika. Stanje obično postaje bolje za nekoliko dana ili tjedana, ovisno o veličini spermatocele.
- Rana se može inficirati, što je popraćeno crvenilom. U tom slučaju bi mogli biti potrebni antibiotici.
- Moguće je da bude svrbeža ili nelagode u predjelu rane koje može potrajati i do 6 mjeseci.
- Moguće je krvarenje unutar mošnji nakon operacije, koje može stvoriti hematoma ili krvni ugrušak. Tijekom slijedećih tjedana će se hematoma povlačiti ili će, u slučaju da je hematoma velik, biti potrebna daljnja operacija.
- Moguća je pojava neosjetljivosti u području operativnog ožiljka tijekom nekog vremena; stanje bi se trebalo poboljšati za par mjeseci.
- Moguća je pojava određene nelagode ili zadebljanja oko operiranog testisa koje može ostati nakon operacije.
- Moguć je ponovni nastanak spermatocele
- Moguća je atrofija (smanjenje) testisa
- Moguća je opstrukcija epididimisa

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.