


TVT(Tension-free Vaginal Tape) i SPARC (Supra Pubic ARC) su tzv. sling metode koje koriste retropubični(iza stidne kosti) prostor za postavljanje polipropilenske trake ispod mokraćne cijevi.Zahvat se najčešće radi u lokalno potenciranoj anesteziji. Radi se o tipu anestezije pri kojem pacijentica intravenski dobiva sredstvo protiv bolova i sredstvo za smirenje, a u operacijsko polje se daje lokalni anestetik.Na prednoj stjenci vagine napravi se mali rez zbog prepariranja mokraćne cijevi.Traka se postavi ispod mokraćne cijevi i izvuče na dva mala reza iznad stidne kosti.U tom trenutku pacijentica se nakašlje,a u slučaju potrebe traka se dodatno zategne.Na mjestu rezova postave se konci koji samostalno otpadnu nakon 2-3 tjedna.Postavlja se urinarni kateter koji se najčešće odstranjuje prvi ili drugi dan nakon operacije,no ponekad postoji potreba za dužim nošenjem katetera.



RIZICI:

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

TVT,SPARC imaju slijedeće posebne opasnosti i ograničenja:

- Ozljeda mokraćnog mjehura ili mokraćne cijevi(zahটেজবা duže nošenje katetera)
- Retropubični hematom(nakupina krvi u prostoru kroz koji prolazi traka)
- Hematom prednje stjenke vagine
- Pojačano krvarenje
- Urinarna infekcija ili infekcija rane(potrebno liječenje antibioticima)
- Retencija(zahটেজবা duže nošenje katetera,potezanje trake prema dolje,a ponekad i presjecanje trake u lokalnoj anesteziji)
- Urgencija de novo
- Vaginalna,uretralna ili intravezikalna erozija
- Ozleda crijeva i krvnih žila
- Otežano cijeljenje rane na prednoj stjenci vagine
- Osteomijelitis

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.