


URETERORENOSKOPIJA – INFORMATIVNI LETAK

Ureterorenoskopija je zahvat kod kojega se pregledava unutrašnjost mokraćovoda i po potrebi bubrežnih čašica. Izvodi se endoskopskim instrumentom koji se kroz mokraćnu cijev umetne u mjehur, a zatim se uđe u mokraćovod i dalje prema bubregu. Ureterorenoskopija može biti samo dijagnostički zahvat (pregled, biopsija ...), a može biti i terapijski kada se uz pomoć sonde mogu razbijati kamenci. Ovisno o poziciji kamenca izvodi se u regionalnoj ili općoj anesteziji.



RIZICI:

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

URS ima slijedeće posebne opasnosti i ograničenja:

- Zahvat se može prekinuti iz različitih razloga (suženje mokraćne cijevi ili mokraćovoda, krvarenje itd.).
- Može se dogoditi krvarenje iz mokraćnog sustava usljed manipulacije instrumentima što može zahtjevati transfuziju krvi ili pak otvorenu operaciju.
- Moguća je perforacija (probijanje) ili avulzija (otrgnuće) mokraćovoda što može zahtjevati otvorenu operaciju.
- Naknadno je moguće stvaranje ožiljaka duž mokraćne cijevi ili mokraćovoda što može dovesti do njihova sužavanja.
- Moguća je perforacija (probijanje) šupljih organa (crijeva, mjehur) ili krvnih žila što može dovesti do komplikacija kao što su krvarenje, infekcija i druge.
- Moguć je razvoj sepse.
- Neke od komplikacija, ukoliko se loše razviju, mogu dovesti i do smrti.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.