


VAĐENJE JJ PROTEZE – INFORMATIVNI LETAK

Cistoskopija je pregledavanje unutrašnjosti mokraćnog mjehura. Izvodi se uz pomoć cistoskopa (metalni instrument) koji se uvede kroz mokraćnu cijev u mjehur. Mokraćna cijev se podmaže, a zatim se nježno uvede cistoskop u mjehur. Mjehur se ispuni sterilnom tekućinom da bi se mogao u cijelosti pregledati. Nakon toga pomoću instrumenta uhvati se dio proteze vidljiv u mjehuru i sve zajedno izvuče iz mjehura kroz mokraćnu cijev.



**RIZICI:**

ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

**Cistoskopija i vađenje JJ proteze** ima određene rizike i ograničenja:

- Možete osjećati žarenje i imati krvavu mokraću kod prvih nekoliko mokrenja nakon zahvata. Isto bi se trebalo ubrzo smiriti.
- Uobičajen je kratkotrajni osjećaj neugode na strani gdje je vađena proteza. U slučaju jačih bolova moguća je potreba za analgeticima (lijekovi protiv bolova).
- Može doći do uroinfekcije zbog čega ćete morati uzimati antibiotike.
- Ukoliko je stent ostao postavljen predugo (obično duže od godinu dana) postoji mogućnost da se neće moći izvaditi ovim načinom.
- Izuzetno rijetko može doći do perforacije mjehura (mjehur se može probiti) za vrijeme zahvata. Ukoliko se to dogodi, potrebno je učiniti otvorenu operaciju kojom se učinjeni otvor zašije, te ćete morati kroz nekoliko dana imati urinarni kateter da bi mjehur bio prazan dok ne zacijeli. U tom slučaju morat ćete ostati u bolnici nekoliko dana.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim