



VARIKOKELA – INFORMATIVNI LETAK

Varikokela označava proširenje vena sjemenog snopa koje se javlja u oko 15% muškaraca. Češće se javlja na lijevoj strani. Varikokela je povezana s neplodnošću i zato je važno pravovremeno liječenje.

Operacija se izvodi u općoj, regionalnoj ili lokalnoj anesteziji. Kirurški pristup u našoj ustanovi je retroperitonealni. Ponekad je potrebno do 6 mjeseci da bi se vidio efekt operacije.



Opći rizici:

Mogući su rizici vezani uz anesteziju.

Moguće su nuspojave vezane uz korištene lijekova. Obično lagana vrtoglavica, mučnina, kožni osip ili konstipacija.

Specifični rizici:

- Krvarenje iz rane može se nastaviti i nakon operacije zbog čega je rijetko potrebna nova operacija.
- Moguće su i postoperativne infekcije rane.
- Najčešća postoperativna komplikacija je hidrokela (nakupljanja tekućine oko testisa).
- Može doći do ponovne pojave varikokele.
- Rijetka komplikacija je i ozljeda testikularne arterije, koja može dovesti do atrofije testisa.

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.